



Beste patiënt,

U hebt binnenkort een afspraak voor het plaatsen van implantaten.

Bij deze brief vindt u het voorschrift voor de medicatie die u dient te nemen voor en na de behandeling volgens onderstaand schema:

	1 week op voorhand	1 uur voor de ingreep	dag van de ingreep	dag 1 na de ingreep	dag 2 na de ingreep	dag 3 na de ingreep
antibiotica		2 pillen samen	1 bij avondeten	2 per dag	2 per dag	1 per dag
pijnstiller			4 per dag	4 per dag	4 per dag	4 per dag
angstremmer		Indien nodig				
mondspoelmiddel	2 x per dag		2x per dag	2x per dag	2x per dag	2x per dag

Indien u bloedverdunners neemt, moet dit aan de tandarts gemeld worden minstens 2 weken voor de ingreep. Rokers stoppen best minstens twee weken op voorhand en houden dit tot minstens twee weken na de ingreep vol.

Hoe zal het verlopen?

De implantaten worden geplaatst onder lokale verdoving in een daarvoor speciaal ingericht tandartskabinet. Uw kleding en hoofd worden afgedekt met speciale steriele doeken om zo hygiënisch mogelijk te kunnen werken. Dit komt wat onwennig over maar het zal de genezing en de ingroei van de implantaten ten goede komen.

Het zal zeker geen pijn doen tijdens de behandeling zelf. Na de behandeling kan er gedurende enkele dagen een minieme tot matige pijn aanwezig zijn. Dit is afhankelijk van de persoon, locatie, aantal en type implantaten

De dag van de ingreep:

- Neem de pijnstiller die u werd voorgeschreven, voor de verdoving is uitgewerkt. Laat steeds een minimale tussentijd van 4 uur bij het nemen van een pijnstiller.
- De eerste 6 uur kan u een ijspak tegen de wonde houden, dit om de zwelling te vermijden.
- Poetsen van de tanden mag maar niet in de buurt van de wonde.
- U mag gerust eten en drinken maar liefst enkel koude dranken. Wacht wel tot de verdoving is uitgewerkt.
- Vermijd alcohol de eerste dagen.
- Niet zuigen op de wonde of spoelen de eerste 24 uur.

Ongemakken:

- Zwelling is normaal en te verwachten. Maximale zwelling wordt bereikt binnen 48 uur na de ingreep en neemt af vanaf de 4^{de} dag.
- Draadjes kunnen lastig aanvoelen maar zijn noodzakelijk. Deze worden verwijderd een week tot 10 dagen na de ingreep.
- Napijn is normaal. Wacht niet tot de pijnstiller volledig is uitgewerkt alvorens de volgende in te nemen. Hou u wel aan de maximale dosis.
- Nabloeding is mogelijk de eerste 12 tot 24 uur. Klem stevig een gaasje tegen de wonde en bijt hierop gedurende 10 minuten.

Toch nog last of ongerust? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen!

Tandartsenpraktijk Kwadrant

Brialmontlei 38-40

2018 Antwerpen

03 238 25 78