



Beste patiënt,

U hebt binnenkort een afspraak voor het plaatsen van implantaten.

Bij deze brief vindt u het voorschrift voor de medicatie die u dient te nemen voor en na de behandeling volgens onderstaand schema:

| | 1 week op voorhand | 1 uur voor de ingreep | dag van de ingreep | dag 1 na de ingreep | dag 2 na de ingreep | dag 3 na de ingreep |
|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Antibiotica | | 2 tabletten samen | | | | |
| pijnstiller | | | 4 per dag | 4 per dag | 4 per dag | 4 per dag |
| angstremmer | | Indien nodig | | | | |
| mondspoelmiddel | 2 x per dag | | 's morgens | 2x per dag | 2x per dag | 2x per dag |

Indien u bloedverdunners neemt, moet dit aan de tandarts gemeld worden minstens 2 weken voor de ingreep. Rokers stoppen best minstens twee weken op voorhand en houden dit tot minstens twee weken na de ingreep vol.

Hoe zal het verlopen?

DE BEHANDELINGEN GEBEUREN OP EEN ANDER VERDIEP. NEEM DE LIFT NAAR DE 3^{DE} VERDIEPING!

De implantaten worden geplaatst onder lokale verdoving in een daarvoor speciaal ingericht tandartskabinet. Uw kleding en hoofd worden afgedekt met speciale steriele doeken om zo hygiënisch mogelijk te kunnen werken. Dit komt wat onwennig over maar het zal de genezing en de ingroei van de implantaten ten goede komen. Het zal zeker geen pijn doen tijdens de behandeling zelf. Na de behandeling kan er gedurende enkele dagen een minieme tot matige pijn aanwezig zijn. Dit is afhankelijk van de persoon, locatie, aantal en type implantaten

De dag van de ingreep:

- Neem de pijnstillers die u werd voorgeschreven, voor de verdoving is uitgewerkt. Laat steeds een minimale tussentijd van 4 uur bij het nemen van een pijnstillers.
- Poetsen van de tanden mag maar niet in de buurt van de wonde.
- U mag gerust eten en drinken maar liefst enkel koude dranken. Wacht wel tot de verdoving is uitgewerkt.
- Vermijd alcohol de eerste dagen.
- Niet zuigen op de wonde of spoelen de eerste 24 uur.

Ongemakken:

- Zwelling is mogelijk. Maximale zwelling wordt bereikt binnen 48 uur na de ingreep en neemt af vanaf de 4^{de} dag.
- Draadjes kunnen lastig aanvoelen maar zijn noodzakelijk. Deze worden verwijderd een week tot 10 dagen na de ingreep.
- Napijn is normaal. Wacht niet tot de pijnstillers volledig is uitgewerkt alvorens de volgende in te nemen. Hou u wel aan de maximale dosis.
- Nabloeding is mogelijk de eerste 12 tot 24 uur. Klem stevig een gaasje tegen de wonde en bijt hierop gedurende 10 minuten.

Toch nog last of ongerust? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen!

DE BEHANDELINGEN GEBEUREN OP EEN ANDER VERDIEP. NEEM DE LIFT NAAR DE 3^{DE} VERDIEPING!